

Árbol de Decisión de Síntomas del Estudiante

Evalúe a todos los estudiantes por síntomas potenciales de COVID-19 o exposición

Riesgo bajo: síntomas generales



Fiebre ($\geq 100.4^{\circ}\text{F}$)



Dolor de garganta



Congestión nasal/
secreción



Dolor de cabeza



Náusea/vómitos
diarrea



Fatiga/dolor
muscular o del cuerpo

Riesgo alto: síntomas de alerta



Tos



Dificultad para respirar



Perdida de gusto/olfato

¿Exposición a una persona positiva a COVID-19?

Contacto cercano: menos de 6 pies, más de 15 minutos

NO

▶ 1 síntoma de **riesgo bajo**



Enviar a casa



Regreso a la escuela 24 horas después de la resolución de los síntomas (sin medicación para reducir la fiebre)

▶ ≥ 2 síntomas de **riesgo bajo**



Enviar a casa



Evaluación por un proveedor atención médica

O 1 síntoma de **riesgo alto**

1 El proveedor de atención médica confirma el diagnóstico alternativo de los síntomas. Una nota del proveedor de atención médica deberá estar en el expediente. La prueba de PCR del SARS-CoV-2 no es necesaria.



Regreso a la escuela después de 24 horas, sin fiebre y con mejoría de los síntomas

2 **Negativo** en la prueba de PCR del SARS-CoV-2



Regreso a la escuela después de 24 horas, sin fiebre y con mejoría de los síntomas

3 **Positivo** en la prueba de PCR del SARS-CoV-2
O No visita al proveedor or prueba



Regreso a la escuela solo después de 10 días desde el inicio de los síntomas y 24 horas sin fiebre. Poner en cuarentena a los contactos cercanos de casos confirmados. Comuníquese con HCA si tiene preguntas.

SI



Quedarse en casa *



Regreso a la escuela después de 10 días a partir del último contacto, a menos que se desarrollen síntomas. Si se desarrollan síntomas, realizar la prueba de PCR del SARS-CoV-2.

*A menos que estén vacunados, controlan los síntomas. Todos los demás, consulte con un proveedor de atención médica para obtener orientación sobre cuarentena.

Este Árbol de Decisión fue diseñado para ayudar al personal de la escuela y no pretende reemplazar el juicio del médico o establecer un protocolo para todos los pacientes con una condición particular.

El diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo la estrecha supervisión de un proveedor de atención médica calificado.

La orientación podría cambiar 09-26-20